

OEFCAT B2.2.1 08/09 Sekse , seksualiteit en relaties werktabel MET SLEUTEL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |
| Nr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |
| 1  | <p>Bij de vrouw gaat door het lieskanaal het ligamentum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ovarii proprium</li> <li>b. inguinale</li> <li>c. teres uteri</li> <li>d. latum</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c |  |  |  |  |  |
| 2. | <p>In zijn beloop van de testis naar de prostaat passeert de ductus deferens de buikwand. Daarbij worden achtereenvolgens de volgende lagen van de buikwand gepasseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. m. obliquus abdominis externus, m. transversus abdominis en m. obliquus abdominis internus</li> <li>b. m. obliquus abdominis internus, m. transversus abdominis en m. obliquus abdominis externus</li> <li>c. m. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis internus en m. transversus abdominis</li> <li>d. m. transversus abdominis, m. obliquus abdominis internus en m. obliquus abdominis externus</li> </ul> | c |  |  |  |  |  |
| 3. | <p>Wat is het parametrium?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. de peritoneale bekleding van de uterus en de adnexen</li> <li>b. het caudale cilindervormige deel van de uterus</li> <li>c. het vaten bevattend bindweefsel in het ligamentum latum</li> <li>d. de met fimbriae omgeven opening van de tuba uterina</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c |  |  |  |  |  |
| 4. | <p>Welk onderstaande structuur vormt een verbinding tussen het ovarium en de uterus?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ligamentum suspensorium ovarii</li> <li>b. ligamentum ovarii proprium</li> <li>c. het parametrium</li> <li>d. ligamentum teres uteri</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b |  |  |  |  |  |
| 5  | <p>De lymfe van de ovaria wordt gedraineerd op de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. para-aortale lymfeklieren</li> <li>b. inguinale lymfeklieren</li> <li>c. iliacale lymfeklieren</li> <li>d. femorale lymfeklieren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |
| 6  | <p>Bij de behandeling van seksueel misbruikte kinderen moeten de ouders betrokken worden tenzij</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. de ouders erg veel moeite hebben met het misbruik van hun kind</li> <li>b. een van de ouders een vermoedelijke dader is</li> <li>c. de ouders ernstige relatieproblemen hebben</li> <li>d. een ouder een psychiatrische aandoening heeft</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | b |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |  |  |  |
| 7  | <p>Wat is goed gedrag, in het kader van professionaliteit van de arts in het contact met de patiënt,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. respect voor en solidariteit met de patiënt in het taalgebruik laten doorklinken</li> <li>b. eigen normen en waarden buiten de dagelijkse praktijk laten</li> <li>c. de hulpvraag van de patiënt inwilligen</li> <li>d. een neutrale gezichtsuitdrukking en lichaamshouding tonen</li> </ul>                                                                           | a |  |  |  |  |  |
| 8  | <p>De doelstellingen van een patiënt en die van de arts kunnen tijdens een consult verschillen. Hierdoor kan een contact disfunctioneel worden. Dit is het geval indien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. arts en patiënt er niet in slagen elkaars doelen te begrijpen</li> <li>b. tijdens het contact veel overleg moet plaatsvinden</li> <li>c. er moet worden onderhandeld over de te bereiken doelen</li> <li>d. slechts een van beiden zijn doel bereikt</li> </ul>                                     | a |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |  |  |  |
| 9  | <p>Het belangrijkste effect van het progestativum in de mini-pil is</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. het voorkómen van ovulatie door remming van de afgifte van gonadotropine</li> <li>b. het remmen van de synthese van oestrogeen-receptoren in het myometrium</li> <li>c. het stimuleren van de vroegtijdige proliferatie van het endometrium</li> <li>d. het remmen van het effect van oestrogeen op het endometrium tijdens de folliculaire fase</li> </ul>                                             | d |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |  |  |  |
| 10 | <p>Wanneer mannen ouder worden is er sprake van een</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. afname van LH</li> <li>b. toename van SHBG</li> <li>c. toename van oestrogenen</li> <li>d. afname van testosteron</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d |  |  |  |  |  |
| 11 | <p>Jongensachtig spelgedrag van een meisje kan mede verklaard worden door</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. verhoogde testosteronspiegels van de moeder tijdens de zwangerschap</li> <li>b. verlaagde productie van oestrogeen door de foetale ovaria</li> <li>c. oestrogeen-resistentie van het centrale zenuwstelsel</li> <li>d. verhoogde activiteit van het enzym aromatase in de hersenen</li> </ul>                                                                                                     | a |  |  |  |  |  |
| 12 | <p>Bij de huisarts komt een meisje van 16 jaar met primaire amenorroe. Zij is gezond en verder, ook qua lichaamslengte, normaal ontwikkeld. In de familie komt pseudohermafroditisme voor. Bij nader onderzoek in het ziekenhuis blijkt er geen ovarieel weefsel bij haar aanwezig te zijn<br/>Dit wijst op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. congenitale adrenale hyperplasie</li> <li>b. het syndroom van Klinefelter</li> <li>c. testiculaire feminisatie</li> <li>d. het syndroom van Turner.</li> </ul> | c |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |  |  |  |  |
| 13 | Een erectie van de man komt tot stand door relaxatie in de penis van<br>a. dwarsgestreept spierweefsel<br>b. glad spierweefsel<br>c. arteriolen<br>d. venen.                                                                                                                                                                                                               | <b>b</b> |  |  |  |  |  |
| 14 | De aanwezigheid van ovaria en mannelijke uitwendige geslachtskenmerken bij een baby met een 46-XX chromosomenpatroon kan wijzen op<br>a. sterk verhoogde aromatase activiteit in de perifere weefsels<br>b. een algemene oestrogeen-resistentie<br>c. blootstelling aan hoge LH-spiegels tijdens de ontwikkeling<br>d. een bijniertumor van de moeder                      | <b>d</b> |  |  |  |  |  |
| 15 | Sertoli cellen produceren<br>a. dihydrotestosteron<br>b. anti-Müller hormoon<br>c. gonadotrofinen<br>d. testosteron                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>b</b> |  |  |  |  |  |
| 16 | Androsteendion<br>a. wordt gevormd in de bijnierschors van de vrouw<br>b. is de niet-actieve vorm van dihydrotestosteron<br>c. is een androgeen dat gevormd wordt in het corpus luteum<br>d. is een eiwit-hormoon                                                                                                                                                          | <b>a</b> |  |  |  |  |  |
| 17 | Als een man de klacht 'onvervulde kinderwens' rapporteert en kleine testes heeft, zal de geraadpleegde arts de volgende aandoening opnemen in zijn differentiaaldiagnose<br>a. het syndroom van Klinefelter<br>b. het syndroom van Turner<br>c. androgeen ongevoeligheidssyndroom<br>d. congenitale bijnierhyperplasie                                                     | <b>a</b> |  |  |  |  |  |
| 18 | Het toedienen van androgenen is te overwegen bij de behandeling van<br>a. een verminderd seksueel verlangen bij een man<br>b. orgasmeproblematiek bij een man<br>c. te snel klaarkomen bij een man<br>d. erectiefalen.                                                                                                                                                     | <b>a</b> |  |  |  |  |  |
| 19 | Welke bewering is juist?<br>a. de prenatale ontwikkeling van mannelijke hersenen wordt beïnvloed door oestrogeen afkomstig van de moeder<br>b. de prenatale ovaria produceren uitsluitend oestrogeen<br>c. de prenatale ontwikkeling van vrouwelijke hersenen wordt beïnvloed door testosteron afkomstig van de moeder<br>d. de foetale testis produceert geen testosteron | <b>c</b> |  |  |  |  |  |
| 20 | Het terugtrekken van de glans en schacht van de clitoris onder de voorhuid markeert<br>a. de opwindingsfase<br>b. het laatste deel van de herstelfase<br>c. de aanvang van de plateaufase<br>d. het eerste deel van de herstelfase                                                                                                                                         | <b>c</b> |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |  |  |  |  |
| 21 | Nederlandse en Amerikaanse tieners zijn vergelijkbaar qua<br>a. gemiddelde leeftijd van sexarche                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>a</b> |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. percentage ongewenste zwangerschappen</li> <li>c. percentage tieners dat een abortus ondergaat</li> <li>d. het krijgen van seksuele voorlichting</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |  |  |  |  |
| 22 | <p>De volgende geneesmiddelen zijn abortieve anticonceptiemiddelen, behalve</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Multi-load CU</li> <li>b. morning-after pil</li> <li>c. Mirena</li> <li>d. Microgynon 50</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | d |  |  |  |  |  |
| 23 | <p>Het (de) volgende classificatiesysteem (systemen) wordt/ worden het meest gebruikt om seksuele stoornissen in te delen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DSM-IV-TR</li> <li>b. ICD</li> <li>c. LOPS</li> <li>d. DSM-IV-TR, ICD en LOPS</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | d |  |  |  |  |  |
| 24 | <p>Een deel van de vrouwen rapporteert cyclische schommelingen in de seksuele opwindbaarheid met een piek rond de ovulatie. Dit suggereert dat seksuele opwindbaarheid van deze vrouwen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gestimuleerd wordt door progesteron</li> <li>b. niet beïnvloed wordt door oestrogeen</li> <li>c. mede afhankelijk is van de hypothalamische afgifte van GnRH</li> <li>d. geremd wordt door progesteron</li> </ul> | c |  |  |  |  |  |
| 25 | <p>De volgende seksuele disfunctie wordt het meest gemeld door vrouwen op poliklinieken gynaecologie en seksuologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dyspareunie</li> <li>b. anorgasmie</li> <li>c. vaginisme</li> <li>d. seksuele aversie</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | a |  |  |  |  |  |
| 26 | <p>Een deel van de vrouwen kan tot op hoge leeftijd alle stadia van de seksuele responscyclys doorlopen. Hieruit wordt geconcludeerd dat voor de seksuele responscyclus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. progesteron noodzakelijk is</li> <li>b. androgenen niet noodzakelijk zijn</li> <li>c. lage FSH- en LH spiegels noodzakelijk zijn</li> <li>d. oestrogenen niet noodzakelijk zijn</li> </ul>                                        | d |  |  |  |  |  |
| 27 | <p>Een vaginale fotoplethysmograaf meet vaginale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lubricatie</li> <li>b. doorbloeding</li> <li>c. innervatie</li> <li>d. spierspanning</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | b |  |  |  |  |  |
| 28 | <p>Een vrouw kan geen orgasme krijgen tijdens de coïtus. Tijdens masturberen komt zij wel klaar. Haar anorgasmie is</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. primair</li> <li>b. secundair</li> <li>c. situatief</li> <li>d. gegeneraliseerd</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | c |  |  |  |  |  |
| 29 | De gynaecologische afwijking die vooral diepe dyspareunie geeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|    | <p>is een:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. cyste van Bartholin</li> <li>b. ontsteking van de kliertjes van Skene</li> <li>c. intra-uteriene poliep</li> <li>d. endometriosis externa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |  |
| 30 | <p>Bij inspectie van de vrouwelijke uitwendige genitalia kan men het volgende waarnemen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. de labia minora zijn in de regel groter dan de labia majora</li> <li>b. slechts een klein stukje van de clitoris ligt subcutaan</li> <li>c. de labia minora zijn in de regel kleiner dan de labia majora</li> <li>d. er zijn weinig individuele verschillen in grootte en vorm van de labia</li> </ul>                                           | a |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |  |  |  |
| 31 | <p>Onder de menopauze wordt verstaan: de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laatste menstruatie</li> <li>b. levensfase rond (voor en na) de laatste menstruatie</li> <li>c. levensfase vanaf de laatste menstruatie</li> <li>d. periode waarin een vrouw klachten samenhangend met de onregelmatige menstruatiecyclus ervaart</li> </ul>                                                                                                                                    | a |  |  |  |  |  |
| 32 | <p>Onderstaande aandoening is een contra-indicatie voor hormoonsubstitutie met oestrogenen in de overgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. endometriumcarcinoom</li> <li>b. hypertensie</li> <li>c. meningeoom</li> <li>d. osteoporose</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | a |  |  |  |  |  |
| 33 | <p>De gynaecologische afwijking die vooral oppervlakkige dyspareunie geeft is</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. endometriosis externa</li> <li>b. Bartholinitis</li> <li>c. uterus myomatosus</li> <li>d. cervixpoliep</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | b |  |  |  |  |  |
| 34 | <p>Onderstaande bewering over fluor vaginalis is juist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. het gaat per definitie gepaard met jeuk of irritatie</li> <li>b. de meest voorkomende oorzaak is een bacteriële vaginose</li> <li>c. de huisarts kan met eenvoudige middelen de diagnostiek verrichten</li> <li>d. uitsluiten van een SOA is noodzakelijk bij fluor vaginalis</li> </ul>                                                                                         | c |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |  |  |  |
| 35 | <p>Onderstaande bewering over seksueel overdraagbare aandoeningen is correct</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. In een normpraktijk in Nederland stelt de huisarts per jaar bij gemiddeld 10 patiënten een SOA vast</li> <li>b. SOA's komen meer dan 3 keer vaker voor in zeer sterk verstedelijkte gebieden</li> <li>c. Naar schatting vindt 50 % van de behandelingen van SOA plaats door de huisarts</li> <li>d. Herpes genitalis is de meest voorkomende SOA</li> </ul> | a |  |  |  |  |  |
| 35 | <p>Welke uitspraak over syfilis is niet juist?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tertiaire stadium: cardiovasculaire en neurologische schade</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | c |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. latente stadium: geen symptomen, maar kan levenslang persisteren</li> <li>c. incubatie bedraagt 3-5 dagen</li> <li>d. primaire stadium: sjanker op de plek van infectie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |  |  |  |  |  |
| 36 | <p>Sir William Osler (19de eeuw) staat bekend om zijn prikkelende uitspraken. Osler bedoelde met "The physician who knows syphilis knows medicine" dat syfilis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in zijn tijd vaak voorkwam</li> <li>b. ieder orgaan in het lichaam kan aantasten</li> <li>c. model staat voor alle infectieziekten</li> <li>d. klinisch kan lijken op vele andere ziekten</li> </ul>                                                                                           | <b>d</b> |  |  |  |  |  |
| 37 | <p>In welk stadium van syfilis komt bacteriëmie voor?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. primaire stadium</li> <li>b. tertiaire stadium</li> <li>c. latente syfilis</li> <li>d. secundaire stadium</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>a</b> |  |  |  |  |  |
| 38 | <p>In het secundaire stadium van syfilis worden huid- en slijmvlieslesies gezien. Men kan de diagnose het beste bevestigen door</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. een huidtest met treponema-antigeen</li> <li>b. serologisch onderzoek</li> <li>c. het kweken van de lesie</li> <li>d. een Grampreparaat</li> </ul>                                                                                                                                                                            | <b>b</b> |  |  |  |  |  |
| 39 | <p>Onderstaande uitspraken gelden voor vaginosis, behalve</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diabetes mellitus en de anticonceptiepil predisponeren voor vaginosis</li> <li>b. de frequentie neemt toe bij menopausale patiënten</li> <li>c. wordt meestal veroorzaakt door opportunistische micro-organismen</li> <li>d. de frequentie neemt af tijdens de zwangerschap</li> </ul>                                                                                                              | <b>d</b> |  |  |  |  |  |
| 40 | <p>Een primaire HIV infectie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gaat onbehandeld altijd over in AIDS</li> <li>b. is binnen een paar dagen na de initiële infectie te diagnosticeren dmv serologie</li> <li>c. kan zich voordoen als een milde mononucleosis infectiosa</li> <li>d. is niet besmettelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <b>c</b> |  |  |  |  |  |
| 41 | <p>Onderstaande bewering is waar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Sarcoptes scabiei</i> (menselijke schurftmijt) wordt niet als SOA overgedragen</li> <li>b. crablouse of schaamluis zal minder frequent voorkomen nu de schaamstreek vaak geschoren wordt</li> <li>c. een pijnlijke lesie in de schaamstreek wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een infestatie met parasiet</li> <li>d. vergrote lymfklieren in de lies wijzen op een <i>Trichomonas vaginalis</i> infectie</li> </ul> | <b>b</b> |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |  |  |  |  |  |
| 42 | <p>Een kwalitatieve benadering is van belang in medisch onderzoek om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. een beeld te krijgen van de omvang van het probleem</li> <li>b. een beeld te krijgen van de aard van het probleem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>b</b> |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. de persoonlijke achtergrond van de medisch onderzoeker in het onderzoek te integreren</li> <li>d. de persoonlijke achtergrond van de medisch onderzoeker in het onderzoek te reduceren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |  |  |  |  |
| 43 | <p>Testosteron speelt een rol in de seksuele respons cyclus. Een laag serum testosteron bij de man (hypogonadisme) kan de volgende consequentie hebben):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. afname van het seksueel verlangen</li> <li>b. toename van seksueel verlangen</li> <li>c. toename van slaap erecties</li> <li>d. ejaculatio praecox (snel klaarkomen)</li> </ul>                                                                                                                                 | <b>a</b> |  |  |  |  |  |
| 44 | <p>In 1998 kwam de eerste PDE-5 remmer, sildenafil (Viagra®) op de markt. De erectie-ondersteunende werking van de PDE5-remmers berust op het volgende fysiologische principe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. betere geleiding van seksuele prikkels</li> <li>b. onderdrukking van faalangst door werking op het limbisch systeem</li> <li>c. versterking van vasodilatatie in het zwellichaam van de penis</li> <li>d. verhoging van de bloeddruk door een inotrope werking op de hartspier</li> </ul> | <b>c</b> |  |  |  |  |  |
| 45 | <p>De volgende variabelen heeft de minst voorspellende waarde voor de aanwezigheid van een erectiestoornis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hart- en vaatziekten</li> <li>b. masturbatie</li> <li>c. ziekte van Peyronie</li> <li>d. overspannenheid</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>b</b> |  |  |  |  |  |
| 46 | <p>Een man heeft een dwarslaesie ter hoogte van de nek. Hij zal een erectie kunnen krijgen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. zowel door fantasie als door masturbatie</li> <li>b. wel door masturbatie, maar niet door erotische video's</li> <li>c. door erotische video's maar niet door masturbatie</li> <li>d. noch door erotische video's, noch door masturbatie</li> </ul>                                                                                                                           | <b>b</b> |  |  |  |  |  |
| 47 | <p>Bij ejaculatio praecox wordt niet toegepast :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. cognitieve gedragstherapie</li> <li>b. sensate focus oefeningen</li> <li>c. farmacologische therapie</li> <li>d. bekkenbodembiotherapie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>d</b> |  |  |  |  |  |
| 48 | <p>De ziekte van Peyronie, die gepaard gaat met kromstand van de penis en pijn, ontstaat door bloedinkjes en littekens in het kapsel van het zwellichaam. Genetische factoren spelen hierbij een rol. De prevalentie van de ziekte van Peyronie ligt rond de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 0,1 procent</li> <li>b. 3 procent</li> <li>c. 10 procent</li> <li>d. 20 procent</li> </ul>                                                                                                                  | <b>b</b> |  |  |  |  |  |
| 49 | <p>De beste combinatie van onderzoeken om prostaatacarcinoom op te sporen is PSA bepaling en</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rectaal toucher</li> <li>b. transrectale echografie</li> <li>c. een CT-scan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>d</b> |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|    | d. rectaal toucher plus transrectale echografie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |  |  |  |
| 50 | <p>De psychosociale hulpverlening aan homoseksuelen die geïnspireerd is op het minderheidsstressmodel heeft als fundamenteel uitgangspunt dat het</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in de hulpverlening niet uitmaakt welke seksuele oriëntatie een persoon heeft</li> <li>b. essentieel is om homoseksuelen er op te wijzen dat ze een minderheidspositie hebben in de samenleving</li> <li>c. er om gaat het welbevinden te bevorderen door hen adequate copingvaardigheden te leren en de negatieve effecten van stigma en hun minderheidspositie op te vangen</li> <li>d. functioneel is hen te leren aanvaarden dat homoseksualiteit weliswaar een stoornis is, maar dat deze een goed leven niet in de weg staat</li> </ul> | c |  |  |  |  |  |